



SUMMUS

Summus Ai Vi

Капли для глаз с витаминами и аминокислотами против усталости глаз и затуманенности зрения.

Отпускаются без рецепта врача.

Показания к применению:

- Усталость глаз при длительных нагрузках (работа с компьютером, чтение, просмотр телевизора и другие)
- Воспаление в результате контакта с водой во время купания, контакта с пылью, попадания пота в глаза.
- Воспаление глазного яблока в результате контакта с ультрафиолетовыми или другими лучами («снежная слепота» и прочее).
- Блефарит (воспаление век).
- Дискомфорт при использовании контактных линз.
- Зуд.
- Затуманенность зрения (в результате чрезмерных слизистых выделений и других причин).

Способ применения:

1–3 капли в каждый глаз, не более 3–6 раз в день. Капли подходят для ежедневного применения.

Состав:

- Витамин В12 (Cyanocobalamin) — улучшает аккомодационную способность глаза, снимает усталость. Данный препарат имеет красный цвет благодаря витамину В12.
- Витамин В6 (Pyridoxine hydrochloride) — стимулирует метаболизм в тканях глаза.
- Витамин Е (Tocopherol acetate) — улучшает периферическое кровообращение, способствует снабжению тканей глаза питательными веществами.
- Аспартат магния и калия (Potassium and magnesium L-aspartate) — обеспечивает ткани глаза необходимыми питательными веществами — магнием и калием. Магний и калий — два минерала, которые играют ключевую роль в здоровье клеток и тканей. Они имеют особо важное значение для сохранения здоровья и функционирования сосудов.
- Хондроитин сульфат натрия (Chondroitin sulfate sodium) — удерживает влагу в роговице глаза, препятствует сухости.
- Хлорфенирамина малеат (Chlorpheniramine maleate) — смягчает симптомы зуда. Одно из сильнейших антигистаминных (противоаллергических) средств.

Особенности хранения и использования:

- Глазные капли — средство индивидуального использования. Не используйте капли совместно с другими людьми.
- При применении детьми, следует использовать капли под контролем родителей.
- Не прикасайтесь наконечником флакона к векам или ресницам.
- Не применяйте капли, если они помутнели, на дне появился осадок.
- Не применяйте во время ношения мягких контактных линз. При ношении линз их нужно снять, использовать средство, и снова надеть линзы через 15 минут после закапывания.
- Храните в плотно закрытом состоянии, в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей и животных.
- Не переливайте в другой контейнер — это может привести к использованию не по назначению или изменению качеств препарата.
- Не применяйте после истечения срока годности, указанном на внешней коробке. Используйте как можно быстрее сразу после вскрытия упаковки до истечения срока годности.
- В зависимости от условий хранения, компоненты препарата могут кристаллизоваться на наконечнике флакона или колпачке. В этом случае бережно удалите застывшие частички препарата с помощью чистой тканевой салфетки.

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Противопоказания и меры предосторожности

Вам нужно проконсультироваться с врачом, если:

- Вы проходите медицинское лечение.
- У вас бывали аллергические реакции на лекарства.
- Вы страдаете от боли в глазах.
- Вам поставлен диагноз глаукома.

При возникновении следующих симптомов после применения капель, необходимо немедленно прекратить использование и проконсультироваться с врачом:

- Сыпь, покраснение и зуд кожи.
- Гиперемия (покраснение), зуд, отёк слизистой глаза.

Также проконсультируйтесь с врачом, если:

- Симптом «тумана» в глазах не проходит.
- Любые симптомы из указанных в показаниях к применению не проходят после использования капель в течение 2 недель.